



Dr. med. Christof Rehbein
Dr. med. Anke van der Does
Fachärzte für Innere Medizin
hausärztliche Versorgung

Weißburger Str. 20-24
63739 Aschaffenburg
Tel 06021 - 120 71
Fax 06021 - 120 73

info@internist-ab.de
www.internist-ab.de

Déclaration de consentement et informations sur la vaccination pour le(s) vaccin(s) suivant(s):

Tétanos/Diphtérie	Oreillons/Rubéole/Rougeole
Tétanos/Diphtérie/Coqueluche	Pneumonie
Tétanos/Diphtérie/Coqueluche/Polio	Grippe
MET	Zona
COVID	

Madame, Monsieur _____ Date: _____

Nous sommes heureux que vous souhaitiez participer à la protection active de votre santé et de celle de votre entourage en voulant vous faire vacciner. Les vaccinations sont importantes pour éviter les maladies dangereuses, car même les options de traitement modernes ne peuvent pas toujours empêcher l'évolution souvent grave de la maladie et les conséquences, par exemple, de la diphtérie, du tétanos, de la grippe, de la TBE, etc. chez les personnes non vaccinées. La seule protection contre ces maladies est la vaccination effectuée à temps et conformément aux directives du Comité permanent de vaccination,

Nous sommes légalement tenus de vous informer des effets secondaires et des risques très rares mais théoriquement possibles avant la vaccination et vous demandons donc de lire ces informations et de déclarer par votre signature que vous vous sentez suffisamment informé et que vous acceptez la vaccination. Toutes les vaccinations sont sûres, mais peuvent entraîner des réactions dites de vaccination, qui peuvent alors occasionnellement provoquer une légère réaction inflammatoire dans le corps qui ne dure que peu de temps.

Réactions locales et générales possibles après la vaccination

- Rougeur ou gonflement douloureux à l'endroit de l'injection du vaccin généralement dans les 1 à 3 premiers jours, qui durent très rarement longtemps
- Gonflement des ganglions lymphatiques voisins
- Formation d'un petit nodule au point d'injection
- Augmentation légère à modérée de la température corporelle
- Symptômes généraux tels que maux de tête et courbatures, frissons, fatigue, troubles circulatoires ou troubles gastro-intestinaux

En règle générale, les réactions mentionnées sont temporaires et disparaissent rapidement et sans conséquences. Comme pour toutes les mesures médicales, des complications vaccinales sévères telles que des allergies sont possibles, mais extrêmement rares; le risque qu'une telle complication survienne est bien inférieur au risque de développer une maladie grave à la suite d'une infection non prévenue par la vaccination.

La vaccination est administrée par une injection dans le muscle de la partie supérieure du bras. Comme pour toutes les injections intramusculaires, cela peut théoriquement entraîner des lésions des nerfs et des vaisseaux sanguins et une contamination du canal de ponction par des bactéries ou des virus. Encore une fois, le risque d'une telle complication est bien inférieur à celui de la maladie qu'elle prévient.

Afin d'améliorer votre sécurité et de minimiser davantage les risques de complications, il est nécessaire de vous examiner avant chaque vaccination et de rester au cabinet pendant 15 minutes après la vaccination. Aucun sport ou autre activité physique exigeante ne doit être pratiqué pendant les 24 heures suivant la vaccination.

J'ai lu et compris les informations énumérées ci-dessus et j'estime avoir été suffisamment éclairé. J'accepte d'avoir le(s) vaccin(s) mentionné(s) ci-dessus ainsi que tout rappel.

Signature: _____